



# Lebensräume für Vögel schaffen in Gemeinschaftsgärten

Ansgar Poloczek



Wieviele Vogelarten  
gibt es in Deutschland  
?

- **Brutvögel**
  - **regelmäßig**
  - **unregelmäßig**
  - **ehemals**
- **Gastvögel**
- **Natürlich vorkommende Arten**
- **Eingebürgerte Arten (Neozoa)**



Brutvögel



Gastvögel



Natürlich vorkommende Arten vs Neozoa

## Deutschland

Regelmäßige Brutvögel	248
Unregelmäßige/ehemalige Brutvögel	24
regelm. brütende Neozoa	20

*Weltweit über 10 000 Vogelarten*



# Städtische Lebensräume







**Welche Strukturen kann ein Garten bereitstellen, die für Vögel notwendig sind?**



Bruthabitate



Nahrungshabitate



# Brutökologische Gilden

- Höhlenbrüter
- Nischenbrüter
- Freibrüter
- Bodenbrüter






**(Baum) Höhlenbrüter**

**(Baum)Höhlenbrüter**







## Einschlupflochgrößen

Art	Optimales Einflugloch
Blaumeise	26 - 28 mm ø
Tannenmeise	26 - 28 mm ø
Haubenmeise	26 - 28 mm ø
Sumpfmeise	26 - 28 mm ø
Weidenmeise	26 - 28 mm ø
Kohlmeise	32 mm ø
Kleiber	32 - 45 mm ø
Trauerschnäpper	32 - 34 mm ø
Haussperling	32 - 34 mm ø
Feldsperling	32 mm ø
Star	45 mm ø
Gartenrotschwanz	oval: 48 mm hoch, 32 mm breit



# Blaumeise





**Kohlmeise**



Haussperling (*Passer domesticus*)







Feldsperling (*Passer montanus*)








Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*)



Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*)



Hausrotschwanz







Bachstelze *Motacilla alba*

**Freibrüter**

Baumbrüter / Strauchbrüter



Amsel





Amsel (*Turdus merula*)



M. Scharping





Wintergoldhähnchen  
*Regulus regulus*



# Bodenbrüter - Wiesenbrüter



**Bodenbrüter - Vegetationsbrüter**





Rotkehlchen  
(*Erithacus rubecula*)



Zaunkönig  
(*Troglodytes troglodytes*)






# Nahrungsökologische Gilden

- Carnivore Baumvögel
- Carnivore Bodenvögel
- Herbivore Baumvögel
- Herbivore Bodenvögel
- Stammkletterer
- Ansitzjäger auf Insekten
- Ansitzjäger auf Vertebraten
- Luftjäger
- Wasservögel



# Nahrungsökologische Gilden







**Je reichhaltiger die Flora – umso vielfältiger ist auch die Fauna!**





**Möglichst reichhaltiges Angebot an  
Blüten übers Jahr**



Den Boden bedeckt lassen –  
„Unkräuter“ zulassen.



Verblühte Pflanzen im  
Herbst und Winter stehen  
lassen.



Gefüllte Blüten vermeiden.









Stieglitz



Wilde Karde –  
*Dipsacus silvestris*























# Wacholderdrossel







Stadttaube

(*Columba livia f. domestica*)



Stadttaube

(*Columba livia f. domestica*)

Verwilderte Felsentaube

Koloniebrüter

Nischenbrüter



Ringeltaube  
(*Columba palumbus*)



Ringeltaube  
(*Columba palumbus*)


Heimischer Wildvogel  
Einzelbrüter  
i.d.R. Baumbrüter













**Blaumeise**





Wacholderdrossel




Stieglitz





Rotkehlchen







**Kohlmeise**

Danke für die  
Aufmerksamkeit!





Ansgar Poloczek  
Artenschutzreferent

NABU Landesverband  
Berlin e.V.  
Wollankstraße 4  
13187 Berlin  
<http://berlin.nabu.de>

[apoloczek@nabu-berlin.de](mailto:apoloczek@nabu-berlin.de)